

流感疫苗接種須知及意願書

保護效果：

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符、以及不同年齡或身體狀況而異，平均約為30-80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此，每年均須重新接種。本計畫使用依據世界衛生組織每年對北半球建議價數（三價/四價）及抗原成分之流感疫苗，其保護效力與國際各國狀況相同。三價流感疫苗包含3種不活化病毒株，即2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria），四價流感疫苗另新增1種B型不活化病毒株（Yamagata）。本（113）年度政府採購的四價流感疫苗含有世界衛生組織所建議之抗原成分，保護效力與國際各國狀況相同。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年。完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

接種禁忌：

- 一、 已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
- 二、 過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

接種注意事項：

- 一、 發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、 出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、 先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群（GBS）者，宜請醫師評估。
- 四、 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

安全性及副作用：

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

目前研究發現，雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率，國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種流感疫苗。

113年度新北市醫療院所醫事人員/非醫事人員-流感疫苗接種意願書

姓名	性別	出生日期	身分證字號	聯絡電話
	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女			
醫療院所名稱：			十碼章代碼：	
院所地址：新北市 區 路 段 巷 弄 號 樓				
接種對象別： <input type="checkbox"/> 具執業登記醫事人員 <input type="checkbox"/> 非醫事人員(職稱：_____)				

上述資料經 _____ 所屬醫療院所核章 日期： 年 月 日查核認定無誤。

我已詳閱「流感疫苗接種須知」並填妥意願書，經醫師評估後接種。

醫師評估可否接種： <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否	接種日期：	疫苗廠牌批號：	體溫：
醫師簽章：	接種單位：	接種護理人員：	接種者簽名：

※接種前請攜帶健保 IC 卡及接種身分證明(非醫事人員須提供勞健保投保證明等)文件。